



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 74040003

Ancien N° régional : 74420000

## Marais de la Praux et de la Bossenot

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 44,19 ha

Haute-Savoie ALLINGES, LYAUD, ORCIER

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens	2	Reptiles	2	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	3
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	3	Crustacés	0	Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques	0	Papillons	2

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante  
1 = prospection insuffisante  
2 = prospection assez bonne  
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 121

### Description et intérêt du site

Cet ensemble est constitué de deux "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalins, installés sur une légère pente et parcourus par plusieurs petits écoulements issus de sources chargées en calcaire, à l'origine de plages tufeuses. Ils sont encadrés au sud par une décharge récente très proche du marais de la Praux et au nord par une zone d'activités industrielles. Ils sont principalement composés de formations à Choin noirâtre ou à Molinie bleue, ainsi que d'une cladiaie (formation végétale dominée par le Marisque) et d'une roselière, cette dernière formation abritant une avifaune intéressante et variée. Ces zones ouvertes sont entrecoupées de zones boisées mésophiles. Le bas-marais à Choin noirâtre et la moliniaie abritent huit espèces végétales protégées au niveau national ou régional. En l'absence de pratiques agricoles traditionnelles ces milieux ouverts ont tendance à être envahis par les petits ligneux (Bourdaine principalement) ou certaines espèces herbacées exclusives (roseaux, Marisque ou Jonc subnoduleux).

## Milieus naturels

37.31	PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
53.3	VEGETATION A CLADIUM MARISCUS
54.12	SOURCES D'EAU DURE
54.2	BAS-MARAIS ALCALINS

## Flore

Aigremoine odorante	<i>Agrimonia procera</i> Wallr.
Berle dressée	<i>Berula erecta</i>
Calamagrostide blanchâtre	<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth
Laïche des rives	<i>Carex riparia</i> Curtis
Circée des Alpes	<i>Circaea alpina</i> L.
Orchis jaune pâle	<i>Dactylorhiza ochroleuca</i> (Wüstm. ex Boll.) Holub
Orchis de Traunsteiner	<i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Sauter) Soó
Rossolis à feuilles longues	<i>Drosera longifolia</i> L.
Rossolis à feuilles rondes	<i>Drosera rotundifolia</i> L.
Epipactis violacé	<i>Epipactis purpurata</i> Sm.
Gentiane d'Allemagne	<i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner
Orchis odorant	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M. Richard
Impatiante ne-me-touchez-pas	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.
Inule de Suisse	<i>Inula helvetica</i> Weber
Lathrée écaïlleuse	<i>Lathraea squamaria</i> L.
Énanthe fistuleuse	<i>Oenanthe fistulosa</i> L.
Énanthe de Lachenal	<i>Oenanthe lachenalii</i>
Ophioglosse commun (Langue de serpent)	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.
Groseiller rouge	<i>Ribes rubrum</i> L.
Saule rampant	<i>Salix repens</i> L.
Choin ferrugineux	<i>Schoenus ferrugineus</i> L.
Cumin des prés (Fenouil des chevaux)	<i>Silaum silaus</i>
Fougère des marais	<i>Thelypteris palustris</i> Schott
Petite Utriculaire	<i>Utricularia minor</i> L.

## Faune vertébrée

### Amphibiens

Sonneur à ventre jaune	<i>Bombina variegata</i>
Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>

### Mammifères

Lièvre variable	<i>Lepus timidus</i>
-----------------	----------------------

### Oiseaux

Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>

## Faune invertébrée

### Libellules

Agrion délicat	<i>Ceriagrion tenellum</i>
Cordulégastre bidenté	<i>Cordulegaster bidentata</i>
Cordulie à taches jaunes	<i>Somatochlora flavomaculata</i>
Sympetrum jaune	<i>Sympetrum flaveolum</i>

## Bibliographie

### CORA

*Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1*

146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

### GRAND D.

*Les libellules du Rhône*

255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon

### JACOB L.

*Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté*

16 p pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

\*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007

Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74

**MORAND A.**

*Une espèce vulnérable : le sonneur à ventre jaune*

p 33 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble

**TAKORIAN L.**

*Bombina variegata : inventaire des populations, effectifs, mesures conservatoires - site de l'Etournel*

22 p pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes




Liberté - Égalité - Fraternité  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°74040003



## Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000  
fonds IGN Scan 25 (C)