

Ancien N° régional :

CHAINONS OCCIDENTAUX DU CHABLAIS

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 6 245 ha

Haute-Savoie

BOEGE, BONNE, BONS-EN-CHABLAIS, BRENTHONNE, BURDIGNIN, CERVENS, CRANVES-SALES, FESSY, FILLINGES, HABERE-LULLIN, HABERE-POCHE, LUCINGES, LULLIN, LYAUD, MACHILLY, ORCIER, PERRIGNIER, REYVROZ, SAINT-ANDRE-DE-BOEGE, SAINT-CERGUES, SAXEL, VAILLY, VIUZ-EN-SALLAZ,

ZNIEFF de type I concernées par cette zone

74070001, 74070002, 74070003, 74070004

Description et intérêt du site

Le massif du Chablais appartient aux « Préalpes » au sens géologique du terme. Ceci signifie qu'en dépit de sa position périphérique, une grande partie des roches qui le constituent proviennent pourtant des zones les plus internes de la chaîne : elles ont ainsi été transportées par "charriage" sur des distances considérables lors des phases de la surrection alpine. Sur les Voirons, flysch gréseux et conglomérats constituent les roches dominantes.

L'ensemble naturel décrit, situé à l'ouest du Chablais, concerne l'échine jalonnée par les Voirons, puis le Forchat et la montagne d'Hermone plus au nord. Ce chaînon, qui n'atteint pas 1500 m d'altitude, bénéficie néanmoins d'un climat très arrosé. L'ensemble, très boisé, occupe essentiellement l'étage montagnard. Malgré une certaine uniformité du couvert végétal, l'ensemble présente un intérêt biologique important.

On observe ainsi certains types d'habitats naturels remarquables (tourbières de transition), et une flore intéressante inféodée aux zones humides (Laïche des borbiers, Fougère des marais, Scirpe de Hudson...), aux forêts (Sabot de Vénus, pyroles...) ou à certaines stations sèches (Cotonnière naine, Cotonnière pyramidale...).

La faune forestière est très bien représentée avec par exemple les ongulés (Cerf élaphe, Chamois...) ou l'avifaune (Bécasse des bois, Chevêchette d'Europe...). La présence du Grand Tétras, encore attestée à une époque récente, n'est malheureusement plus qu'un souvenir ; le Tétras lyre est cependant encore présent. Enfin, libellules et batraciens (Sonneur à ventre jaune) sont nombreux dans les zones humides.

Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble dont les échantillons les plus représentatifs en terme d'habitats ou d'espèces remarquables sont retranscrits par plusieurs zones de type I (tourbières, forêts, zones sommitales...) au fonctionnement fortement interdépendant.

Il souligne particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales :

- en tant que zone d'alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces, dont celles précédemment citées ;
- à travers les connections multiples existant avec d'autres ensembles naturels du Chablais.

L'ensemble présente par ailleurs un intérêt paysager.

Milieux naturels

34.11	PELOUSES MEDIO EUROPEENNES SUR DEBRIS ROCHEUX
34.32	PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
37.31	PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
44.A1	BOIS DE BOULEAUX A SPHAIGNES
51.1	TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES
54.5	TOURBIERES DE TRANSITION

Flore

Aconit paniculé	<i>Aconitum variegatum subsp. paniculatum (Arcangeli) Greuter & Burdet</i>
Laîche brunâtre	<i>Carex brunnescens (Pers.) Poiret</i>
Laîche à deux étamines	<i>Carex diandra Schrank</i>
Laîche des tourbières	<i>Carex limosa L.</i>
Laîche faux-souchet	<i>Carex pseudocyperus L.</i>
Sabot de Vénus	<i>Cyripedium calceolus L.</i>
Orchis de Traunsteiner	<i>Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó</i>
Epipactis violacé	<i>Epipactis purpurata Sm.</i>
Cotonnière spatulée	<i>Filago pyramidata L.</i>
Listère à feuilles cordées	<i>Listera cordata (L.) R. Br.</i>
Cotonnière naine	<i>Logfia minima (Sm.) Dumort.</i>
Ophioglosse commun (Langue de serpent)	<i>Ophioglossum vulgatum L.</i>
Polystic à aiguillons	<i>Polystichum aculeatum (L.) Roth</i>
Potamot plantain	<i>Potamogeton coloratus Hornem.</i>
Potentille des marais (Comaret)	<i>Potentilla palustris (L.) Scop.</i>
Potentille des rochers	<i>Potentilla rupestris L.</i>
Pyrole verdâtre	<i>Pyrola chlorantha Swartz</i>
Pyrole à feuilles rondes	<i>Pyrola rotundifolia L.</i>
Saule faux daphné	<i>Salix daphnoides Vill.</i>
Saule rampant	<i>Salix repens L.</i>
Silène arméria	<i>Silene armeria L.</i>
Rubanier nain	<i>Sparganium minimum Wallr.</i>
Fougère des marais	<i>Thelypteris palustris Schott</i>
Scirpe de Hudson	<i>Trichophorum alpinum (L.) Pers.</i>
Trèfle marron	<i>Trifolium spadiceum L.</i>
Petite Utriculaire	<i>Utricularia minor L.</i>
Vesce des bois	<i>Vicia sylvatica L.</i>

Faune vertébrée

Amphibien	
Sonneur à ventre jaune	<i>Bombina variegata</i>
Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>
Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>
Grenouille rousse	<i>Rana temporaria</i>
Triton alpestre	<i>Triturus alpestris</i>

Mammifère	
Cerf élaphe	<i>Cervus elaphus</i>
Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>

Oiseau	
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>
Chevêchette d'Europe	<i>Glaucidium passerinum</i>
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>
Tétras lyre	<i>Tetrao tetrix</i>

Reptile	
Couleuvre d'Esculape	<i>Elaphe longissima</i>
Lézard des souches	<i>Lacerta agilis</i>
Lézard vivipare	<i>Lacerta vivipara</i>


Faune invertébrée

Libellule	
Aesche isocèle	<i>Anaciaeshna isosceles</i>
Agriion hasté	<i>Coenagriion hastulatum</i>
Cordulégaetre bidenté	<i>Cordulegaster bidentata</i>
Leste dryade	<i>Lestes dryas</i>
Cordulie des Alpes	<i>Somatochlora alpestris</i>
Sympetrum noir	<i>Sympetrum danae</i>
Sympetrum jaune	<i>Sympetrum flaveolum</i>

Bibliographie


Pas de donnée disponible

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF II* N°7407



* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy

Légende

-  Périmètre de la ZNIEFF type 2
-  Autres ZNIEFF type 2
-  ZNIEFF type 1



fonds IGN Scan 100 (C)