



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74070002

Ancien N° régional : 74004700

Mont de Vouan

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Haute-Savoie FILLINGES, SAINT-ANDRE-DE-BOEGE, VIUZ-EN-SALLAZ

Surface : 377,53 ha

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	2
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons	0	Mollusques		Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 30

Description et intérêt du site

Situé en rive gauche de la Menoge, ce petit massif gréseux, culminant à 978 m, est de même nature géologique que le massif des Voirons situé de l'autre côté du torrent. Ce massif, recouvert de forêts (résineux, hêtre, chêne...), se caractérise par la présence d'affleurements rocheux sur sa face ouest, exploités par le passé pour la fabrication des meules. A la base d'une falaise s'ouvre une belle et profonde grotte. On soulignera également la présence d'un étang, la "Gouille au Mort", bordé d'une tourbière et d'une seconde mare plus réduite en surface, abritant chacun une flore et faune originale comprenant quelques espèces protégées. La particularité de cette petite montagne se retrouve dans la nature siliceuse de ses rochers et l'étendue relative de ses derniers qui ont permis à des espèces rares en région Rhône-Alpes (dont plusieurs éléments subalpins comme le Rhododendron ferrugineux présent ici à 800 m d'altitude) de s'installer. Sa faune est tout aussi riche par sa diversité et l'intérêt de quelques espèces : le Lynx est noté occasionnellement, les rochers accueillent le grand Corbeau et le Faucon pèlerin, les pelouses rocheuses le papillon Apollon...

Milieux naturels

34.11 PELOUSES MEDIO EUROPEENNES SUR DEBRIS ROCHEUX

Flore

Laîche faux-souchet	Carex pseudocyperus L.
Cotonnière spatulée	Filago pyramidata L.
Cotonnière naine	Logfia minima (Sm.) Dumort.
Potamot plantain	Potamogeton coloratus Hornem.
Potentille des rochers	Potentilla rupestris L.
Pyrole verdâtre	Pyrola chlorantha Swartz
Saule faux daphné	Salix daphnoides Vill.
Silène améria	Silene armeria L.
Rubanier nain	Sparganium minimum Wallr.
Fougère des marais	Thelypteris palustris Schott
Petite Utriculaire	Utricularia minor L.
Vesce des bois	Vicia sylvatica L.

Faune vertébrée

Amphibiens	
Sonneur à ventre jaune	Bombina variegata
Crapaud commun	Bufo bufo
Grenouille rousse	Rana temporaria
Mammifères	
Cerf élaphe	Cervus elaphus
Chamois	Rupicapra rupicapra
Oiseaux	
Faucon pèlerin	Falco peregrinus
Reptiles	
Couleuvre d'Esculape	Elaphe longissima
Lézard des souches	Lacerta agilis

Faune invertébrée

Libellules	
Aesche isocèle	Anaciaeshna isosceles

Bibliographie

CORA
Reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes : atlas préliminaire, hors série n°1
146 pages 2002 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

JACOB L.
Propositions de gestion de zones humides favorables à deux amphibiens menacés : le Sonneur à ventre jaune et le triton crêté
16 p pages 1999 Consultable : DIREN Rhône-Alpes

MORAND A.
Une espèce vulnérable : le sonneur à ventre jaune
p 33 pages 2001 Consultable : Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble


TAKORIAN L.
Bombina variegata : inventaire des populations, effectifs, mesures conservatoires - site de l'Etournel
22 p pages 2003 Consultable : DIREN Rhône-Alpes



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°74070002



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)