



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74150007

Ancien N° régional :

Etang de Thuet

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 14,90 ha

Haute-Savoie BONNEVILLE

Niveau de connaissance

Milieux naturels	1	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	2
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons	1	Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 17

Description et intérêt du site

Issu de l'exploitation des graviers de la plaine alluviale de l'Arve, l'étang de Thuet est remarquable à plusieurs titres. Bien que partiellement comblé par divers matériaux provenant des activités voisines, il conserve une surface importante et surtout un mode de fonctionnement hydraulique original. En effet, cet étang est un cas très rare, à l'échelle départementale, de plan d'eau à niveau variable. L'assèchement estival y découvre de vastes vasières humides, sur lesquelles se développent des communautés végétales pionnières colonisatrices du type *Nanocyperion* ; celles-ci comptent une remarquable population de l'Héléocharis (ou Scirpe) épinglé. Outre quelques plantes protégées, d'autres formations végétales originales s'observent, en particulier une roselière à *Typha domingensis* (une des deux seules stations départementales de l'espèce). La flore est relativement variée : Castor d'Europe, oiseaux des rives et des marais, libellules... Le site existant, dont les abords sont négligés et la fréquentation anarchique, est cependant soumise à de nombreuses pressions.

Milieux naturels

Pas de données disponibles

Faune vertébrée

Mammifères

Castor d'Europe	<i>Castor fiber</i>
-----------------	---------------------

Poissons

Brochet	<i>Esox lucius</i>
---------	--------------------

Flore

Souchet brun	<i>Cyperus fuscus L.</i>
Héléocharis épingle	<i>Eleocharis acicularis (L.) Roemer & Schultes</i>
Naiade marine	<i>Najas marina L.</i>
Nénuphar blanc	<i>Nymphaea alba L.</i>
Saule faux daphné	<i>Salix daphnoides Vill.</i>
Utriculaire négligée	<i>Utricularia australis R. Br.</i>
Petite Utriculaire	<i>Utricularia minor L.</i>

Faune invertébrée

Libellules

Aesche mixte	<i>Aeshna mixta</i>
Aesche isocèle	<i>Anaciaeshna isosceles</i>
Aesche printanière	<i>Brachytron pratense</i>
Gomphus gentil	<i>Gomphus pulchellus</i>
Libellule fauve	<i>Libellula fulva</i>
Agrion à pattes larges	<i>Platycnemis pennipes</i>
Cordulie à taches jaunes	<i>Somatochlora flavomaculata</i>
Sympetrum noir	<i>Sympetrum danae</i>

Bibliographie

GRAND D.

Les libellules du Rhône


255 pages 2004 Consultable : Société Linnéenne de Lyon



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°74150007



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)