



Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 74200006

Ancien N° régional : 74001000

Mont Veyrier, Mont Baron et Mont Barret

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Haute-Savoie ALEX, ANNECY-LE-VIEUX, MENTHON-SAINT-BERNARD, VEYRIER-DU-LAC

Surface : 520,37 ha

Niveau de connaissance

Milieux naturels	2	Amphibiens		Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	2			Libellules	1
Végétaux supérieurs	2	Oiseaux	2	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	0	Poissons		Mollusques	0	Papillons	0

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 39

Description et intérêt du site

Il s'agit d'un chaînon constitué de trois compartiments successifs, dont les hautes falaises calcaires dominent une grande partie de la rive droite du lac d'Annecy. Outre les milieux rocheux, il est essentiellement occupé par la forêt avec néanmoins des formations herbacées à la base et sur les vives et les assises gazonnées. L'orientation ouest et la nature de la roche permet l'installation d'une végétation à caractère xéro-thermophile (recherchant la sécheresse et la chaleur) sur le versant occidental. Le versant oriental est largement occupé par la forêt montagnarde dominée par le hêtre. En ce qui concerne l'avifaune, on dénombre plusieurs espèces typiquement rupicole (inféodées aux parois rocheuses), telles que l'Hirondelle de rochers et le Faucon pèlerin...

Milieux naturels

31.8123	FRUCTICEES DE STATIONS ROCAILLEUSES A COTONEASTER ET AMELANCHIER
34.32	PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
41.16	HETRAIES SUR CALCAIRE

Faune vertébrée

Mammifères	
Lièvre variable	<i>Lepus timidus</i>
Chamois	<i>Rupicapra rupicapra</i>
Oiseaux	
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>

Flore


Aethionéma des rochers	<i>Aethionema saxatile (L.) R. Br.</i>
Arabette auriculée	<i>Arabis auriculata Lam.</i>
Coronille en couronne	<i>Coronilla coronata L.</i>
Daphné des Alpes	<i>Daphne alpina L.</i>
Fumana fausse bruyère	<i>Fumana ericoides (Cav.) Gandoger</i>
Epervière mouchetée	<i>Hieracium pictum Schleicher ex Pers. gr.</i>
Epervière tomenteuse	<i>Hieracium tomentosum L. [1755]</i>
Gesse noirissante	<i>Lathyrus niger (L.) Bernh.</i>
Orobanche du lierre	<i>Orobanche hederæ Duby</i>
Orobanche du sermontain	<i>Orobanche laserpitii-sileris Reuter ex Jordan</i>
Polystic à aiguillons	<i>Polystichum aculeatum (L.) Roth</i>
Tilleul à petites feuilles	<i>Tilia cordata Miller</i>
Trinie glauque	<i>Trinia glauca</i>
Vesce des buissons	<i>Vicia dumetorum L.</i>
Vesce des bois	<i>Vicia sylvatica L.</i>

Faune invertébrée

Pas de données disponibles

Bibliographie

Pas de données disponibles



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
fonds IGN Scan 25 (C)