Direction Régionale de l'Environnement

RHÔNE-ALPES

BASSIN RHÔNE-MEDITERRANEE

METEO FRANCE

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du BASSIN RHONE-MEDITERRANEE lors de la 2ème décade de JUIN 2009 (du 11 au 20 juin)

RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS



Direction Régionale de l'Environnement

RHÔNE-ALPES

BASSIN RHÔNE-MEDITERRANEE

METEO FRANCE

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du BASSIN RHONE-MEDITERRANEE lors de la 2ème décade de JUIN 2009 (du 11 au 20 juin)

RAPPORT A LA NORMALE DES PRECIPITATIONS DEPUIS LE 1er JUIN 2009



Direction Régionale
de l'Environnement
RHÔNE-ALPES
BASSIN RHÔNE-MEDITERRANEE

METEO FRANCE

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du BASSIN RHONE-MEDITERRANEE lors de la 2ème décade de JUIN 2009 (du 11 au 20 juin)

Sur le bassin Rhône amont :

La cartographie des rapports à la normale des précipitations décadaires coupe le bassin Rhône-amont en deux parties bien distinctes :

- **au nord, des pluies plus abondantes génèrent des rapports à la normale excédentaires** notamment des monts d'Or (69) à ceux du Beaujolais en englobant l'ouest de la Dombes et la Bresse et continuant jusqu'au Dolois et au sud de la Côte d'Or où ceux-ci sont supérieurs à 150% : 245% à Varennes-St-Sauveur et 202% au Mont-St-Vincent (71), 195% à Lons-le-Saunier (39), 177% à Besançon (25), 198% à Savigny-lès-Beaune (21). Du nord des coteaux du Beaujolais au sud du Mâconnais, la hauteur décadaire atteint même quatre fois celle relevée d'ordinaire : 404% de la normale à St-Jean-d'Ardières (69) et 405% à Mâcon (71). Sur le reste de cette partie nord, les cumuls pluviométriques sont normaux à excédentaires, l'excédent étant inférieur à 50%.
- **au sud d'une limite allant des monts du Lyonnais au Bugey et au sud du Haut-Jura, les pluies sont déficitaires à de rares et ponctuelles exceptions** où elles sont normales à excédentaires comme le Pilat, la région du Mont-Lozère dans les Cévennes (157% de la normale à Villefort (48)), celles de Chusclan (30) et de Romans-sur-Isère (26) ainsi que certaines vallées alpines (132% de la normale à Chamonix (74)). Sur cette moitié sud de Rhône-amont, les déficits sont compris entre 25% et 90%. On ne recueille que 75% des hauteurs d'eau habituelles à Lyon-St-Exupéry (69), 50% à Bourg-St-Maurice (73), 17% à Villard-de-Lans (38), 29% à Marsaz et 44% à Montségur-sur-Lauzon (26), 69% à Colombier-le-Jeune et 28% à Chomérac (07), 61% à Bassurels (48), 28% à St-Julien-de-Peyrolas (30), 39% à Orange (84) et 44% à Barcelonnette (04). Un secteur où les cumuls décadaires sont inférieurs à 10% de la valeur moyenne se distingue du sud de Valence au Diois, s'étend jusqu'aux Baronnies et au Comtat Venaissin et se prolonge sur la Bochaine, la montagne de Lure et le nord du plateau de Valensole. Des noyaux se localisent aussi sur l'Embrunais, le Coiron et le Mercantour. Il est à noter que les stations de ces zones reçoivent moins de 2 millimètres d'eau. Certaines, dans la Drôme et les Alpes du sud, affichent même une décade sèche.

A une première décade affichant des pluies globalement excédentaires succède **une deuxième décade où celles-ci sont déficitaires sur le sud du bassin Rhône-amont**, voire fortement déficitaires, alors qu'elles sont excédentaires du Beaujolais au Territoire de Belfort. Malgré tout, la tendance sur la quasi-totalité du territoire est l'atténuation du surcroît d'eau.
Au final, le nord de Rhône-amont reste excédentaire avec un renforcement de ce surplus sur un secteur reliant le nord-est du Rhône aux monts du Mâconnais : 275% de la normale à St-Jean d'Ardières (69) avec +71%

Sur le bassin Rhône-aval :

Sur les Pyrénées Orientales, les cumuls sont **excédentaires ou proches de la normale** (de 1 à 2 fois les quantités normales). Partout ailleurs, les cumuls sont **largement déficitaires** (moins du quart, et le plus souvent moins du dixième des quantités normales).

Depuis le début du mois, on trouve des cumuls déficitaires des Pyrénées Orientales jusqu'à l'extrême sud du Gard (de 75 à 25%), sur une grande partie est de la région avec une zone autour de Marseille et Toulon ainsi que sur l'est de Nice à moins de 25% des quantités normales.
Les zones excédentaires sont l'ouest du Vaucluse et des Bouches du Rhône, le Gard (125 à 300% des normales).

Direction Régionale
de l'Environnement
RHÔNE-ALPES
BASSIN RHÔNE-MEDITERRANEE

METEO FRANCE

SITUATION PLUVIOMETRIQUE du BASSIN RHONE-MEDITERRANEE
lors de la 2ème décade de JUIN 2009 (du 11 au 20 juin)

DONNEES METEO-FRANCE

	JUIN 2009 2ème décade	DEPUIS LE 1 JUIN 2009
	Rapport aux normales (%)	Cumul (%)
LANGRES (52)	121	177
LUXEUIL (70)	118	116
BESANCON (25)	177	133
LONS LE SAUNIER (39) **	190	161
DIJON-LONGVIC (21)	139	184
MACON (71)	405	301
AMBERIEU (01)	77	138
LYON-BRON (69)	84	104
ST ETIENNE-BOUTHEON (42)	189	143
GRENOBLE-ST GEOIRS (38)	35	123
CHAMBERY-AIX (73) *	53	106
BOURG ST MAURICE (73)	50	116
LANAS SYN (07) **	7	66
MONTELIMAR (26)	12	112
LUS LA CROIX HTE (26)	6	113
EMBRUN (05)	4	129
SAINT-AUBAN (04)	1	102
NICE (06)	2	40
ISTRES (13)	6	92
MARIGNANE (13)	185	195
SALON DE PROVENCE (13)	71	140
LE LUC (83)	41	53
HYERES (83)	5	**3**
TOULON (83)	2	**1**
ORANGE (84)	39	212
CARCASSONNE (11)	21	51
NIMES-COURBESSAC (30)	27	172
NIMES-GARONS (30)	0	98
MONT AIGOUAL (30)	8	45
MONTPELLIER (34)	0	36
PERPIGNAN (66)	157	112

Par défaut, les normales portent sur la période 1971/2000.
(*) Normales portant sur la période 1981/2000.
(**) Normales portant sur la période 1991/2000.